

梅 县 农 业 信 息

第四期

梅州市梅县区农业农村局编

2026 年 7 月 6 日

2026 年金柚秋季管理技术

秋季是金柚秋梢生长及果肉膨大充实期，结合秋季的气候特点和金柚的生长特性，为确保金柚的产量和质量，应做好合理施肥、降温保湿、秋梢管理及病虫害防治等工作，具体措施如下：

一、科学施肥

（一）合理施肥。为保证金柚质量，盛产树 8 月上旬停止施用纯化学氮肥，果量较少的壮树应提前至 7 月底；在 8 月份，以株产 100 公斤树为例，结果树增施腐熟有机肥，株施腐熟花生麸肥 2-2.5 公斤加三元复合肥 0.5-1 公斤（或者三元水溶肥 0.25-0.3 公斤）加硼砂 0.05 公斤加七水硫酸镁 0.1-0.25 公斤。9 月份要增施优质液肥，株用淡粪水（或腐熟花生麸水）1-2 担小穴淋施。

（二）施肥方法。一般采用以树冠滴水线为中点，颗粒复合

肥宜放射状撒施后覆土，施肥时注意肥料与泥土的充分混合，以免肥害。

二、降温保湿

（一）护根。为使根群在高温条件下能正常生长，保证其吸收养分、水分能力，一是进行浅松土和培土护根，二是用鲁草、杂草、稻秆等进行果园覆盖，厚度以 5-10 厘米为宜。

（二）调节果园小气候。在“三伏天”高温干旱季节注意清晨和晚间喷水（注意久旱后一次灌水不能过湿，以免引起生理失调导致落叶、裂果）。

（三）清沟排水，基础设施完善。台风雨后及时排除积水，防止烂根。

三、秋稍管理

（一）幼龄树培养秋梢，可在秋梢萌发后进行适当的修剪和拉线等整形工作，以培养丰产的立体结果树冠。

（二）结果树宜抚育好结果母枝（春梢），应注意及时抹除或短截利用好夏梢，剪除病、虫、枯、弱枝及其他重叠交叉枝，以减少养分消耗和病虫害源，增加枝条的养分积累，提高果实品质。

四、护果工作

（一）做好台风雨前后撑果、垫果和高温期防日灼等护果工作。

（二）经常检查套袋柚果（包括蜜柚），发现病虫害时要及时处理。

五、病虫害防治

秋季金柚病害以溃疡病、褐腐疫霉病、黑斑病为主；虫害以

桔小实蝇、潜叶蛾、锈蜘蛛、介壳虫为主。

（一）注意检查果园病虫害发生情况，褐腐疫霉病发生严重的果园做好清沟排水和清除病果，及时地面撒施石灰减少病虫害源。

（二）选用对口农药防治（特别是在台风雨后及时喷药），可选用如下药剂：福星 6000 倍液或氟硅唑 6000 倍防治黑斑病；58 % 雷多米尔可湿性粉剂 600-800 倍防治疫病；77 % 可杀得 500-600 倍防治溃疡病；20 % 三唑锡可湿性粉剂 1500-2000 倍液防治红、锈蜘蛛、介壳虫。

（三）注意加强桔小实蝇防治，坚持以镇、村为单位，开展“群防群治”，及时摘除虫害果并清理处理好，以减少虫源，在果园内挂放诱集瓶诱杀成虫（每亩挂 3-5 个瓶），药剂防治可选用 90 % 敌百虫晶体 500-600 倍液，并在果园及周围杂树树冠喷雾。

（四）抓好黄龙病防控，9-10 月是黄龙病症状最明显的时期，要加强检查，一经发现，立即砍除（注意：砍树前先喷杀柑桔木虱）。

六、果园受浸后的管护

（一）及时清理受浸后留置在果园的垃圾、淤泥、杂物等，修剪断枝、枯枝，检除落果清洁田园；

（二）开沟排水，松土、覆盖等促进根系生长；

（三）每亩撒施石灰 30-35 斤进行地面消毒；

（四）全园喷施 58 % 雷多米尔可湿性粉剂 600-800 倍防治疫病、炭疽病等病害；

（五）根据受浸损失程度，加强肥水管理，恢复树势，保证树体健康生长；

（六）针对个别果园黄化树症状，进行黄化原因分析。对症防控落实生物多样性技术，开展复绿复产工作。